Gebrauchsinformation

Liebe Patientin, lieber Patient,
bitte lesen Sie die gesamte Packungsbeilage sorgfältig durch, bevor Sie mit der Einnahme dieses Arzneimittels beginnen, denn sie enthält wichtige Informationen für Sie.
- Heben Sie die Packungsbeilage auf. Vielleicht möchten Sie diese später nochmals lesen.
- Dieses Arzneimittel wurde Ihnen persönlich verschrieben und sollte deshalb nicht an Dritte weitergegeben werden.
- Wenn Sie weitere Fragen haben, wenden Sie sich bitte an Ihren Arzt oder Apotheker.

Die Packungsbeilage beinhaltet:

1. Was ist Achillea comp. und wofür wird es angewendet?
2. Was müssen Sie vor der Einnahme von Achillea comp. beachten?
3. Wie ist Achillea comp. einzunehmen?
4. Welche Nebenwirkungen sind möglich?
5. Was ist sonst noch wichtig?

Achillea comp.
Mischung

1. Was ist Achillea comp. und wofür wird es angewendet?

Achillea comp. ist ein anthroposophisches Arzneimittel.

Anwendungsgebiete
Gemäß der anthroposophischen Menschen- und Naturerkenntnis gehören zu den Anwendungsgebieten: die Belebung und Strukturierung des Stoffwechsels bei Schwäche des venösen Systems sowie die Beherrschung zu starker Nerven-Sinnes-Prozesse, z.B. bei Hämorrhoiden, Krampfadern, Stauungen im Pfortadergebiet, Ekzemen oder Hauteinrissen im Bereich des Afters, Fisteln.

2. Was müssen Sie vor der Einnahme von Achillea comp. beachten?

Achillea comp. darf nicht angewendet werden,
- wenn Sie überempfindlich (allergisch) gegenüber Schafgarbe oder anderen Korbblütlern sind.
- während der Schwangerschaft.

Vorsichtsmaßnahmen für die Anwendung
Weitere vom Arzt verordnete Maßnahmen wie Wickeln der Beine, Tragen von Stützstrümpfen oder kalte Wassergüsse sollten unbedingt eingehalten werden.
Treten plötzlich ungewohnt starke Beschwerden vor allem an einem Bein auf, die sich durch Schwellung, Verfärbungen der Haut, Spannungs- oder Hitzegefühl sowie Schmerzen bemerkbar machen, sollte unverzüglich ein Arzt aufgesucht werden, da diese Merkmale Anzeichen einer ernsten Erkrankung (Beinvenenthrombose) sein können.
Bei Schmerzen oder blutigem Stuhl ist die Rücksprache mit dem Arzt erforderlich, da diese Merkmale Anzeichen einer Erkrankung sein können, die ärztliches Eingreifen erfordert.

Kinder
Zur Anwendung von Achillea comp. bei Kindern unter 12 Jahren liegen keine ausreichend dokumentierten Erfahrungen vor. Es sollte deshalb nicht angewendet werden.

Stillzeit
Wie alle Arzneimittel sollte Achillea comp. in der Stillzeit nur nach Rücksprache mit dem Arzt angewendet werden.

Wechselwirkungen mit anderen Arzneimitteln
Keine bekannt
Bitte informieren Sie Ihren Arzt oder Apotheker, wenn Sie andere Arzneimittel einnehmen bzw. vor kurzem eingenommen haben, auch wenn es sich um nicht verschreibungspflichtige Arzneimittel handelt.

Verkehrstüchtigkeit und das Bedienen von Maschinen
Es sind keine besonderen Vorsichtsmaßnahmen erforderlich.

Wichtige Informationen über bestimmte Bestandteile von Achillea comp.
Dieses Arzneimittel enthält 158 mg Alkohol (Ethanol) pro Einzeldosis von 10 Tropfen, entsprechend 54 Vol.-% Alkohol.
Die Menge in zehn Tropfen dieses Arzneimittels entspricht weniger als 5 ml Bier oder 2 ml Wein. Die geringe Alkoholmenge in diesem Arzneimittel hat keine wahrnehmbaren Auswirkungen.

3. Wie ist Achillea comp. einzunehmen?

Nehmen Sie Achillea comp. immer genau nach der Anweisung des Arztes ein.

Falls vom Arzt nicht anders verordnet, ist die übliche Dosis:
3 mal täglich 10 – 15 Tropfen einnehmen.
Nehmen Sie die Tropfen am besten mit Wasser verdünnt ein.
Um eine gleichmäßige Verteilung bei der Entnahme zu gewährleisten, sollte die Flasche vor Gebrauch geschüttelt werden.

Dauer der Anwendung
Die Behandlung einer akuten Erkrankung sollte nach 2 Wochen abgeschlossen sein. Tritt innerhalb dieser Zeit keine Besserung ein, ist ein Arzt aufzusuchen. Die Behandlung von chronischen Krankheiten erfordert eine Absprache mit dem Arzt.

Wenn Sie die Einnahme von Achillea comp. vergessen haben:
Nehmen Sie nicht die doppelte Dosis, wenn Sie die vorherige Einnahme vergessen haben.

Bitte fragen Sie bei Ihrem Arzt oder Apotheker nach, wenn Sie sich bei der Anwendung dieses Arzneimittels nicht ganz sicher sind.

4. Welche Nebenwirkungen sind möglich?

Bei sensibilisierten Personen können Überempfindlichkeitsreaktionen auftreten. Das Arzneimittel ist dann abzusetzen und ein Arzt aufzusuchen.

Meldung von Nebenwirkungen
Wenn Sie Nebenwirkungen bemerken, wenden Sie sich an Ihren Arzt oder Apotheker. Dies gilt auch für Nebenwirkungen, die nicht in dieser Packungsbeilage angegeben sind. Sie können Nebenwirkungen auch direkt dem *Bundesinstitut für Arzneimittel und Medizinprodukte, Abt. Pharmakovigilanz, Kurt-Georg-Kiesinger Allee 3, D-53175 Bonn, Website: www.bfarm.de* anzeigen. Indem Sie Nebenwirkungen melden, können Sie dazu beitragen, dass mehr Informationen über die Sicherheit dieses Arzneimittels zur Verfügung gestellt werden.

5. Was ist sonst noch wichtig?

Sie dürfen das Arzneimittel nach dem auf dem Etikett und der Faltschachtel angegebenen Verfalldatum nicht mehr verwenden.

Zusammensetzung
10 g (= 10,8 ml) enthalten: Wirkstoffe: Aesculus, Cortex, ethanol. Decoctum Dil. D3 [D3 mit Ethanol 43 % (m/m)] 2 g / Antimonit Dil. D8 [D8 mit Ethanol 43 % (m/m)] 2 g / Gentiana lutea, ethanol. Decoctum Dil. D3 [ab D2 mit Ethanol 43 % (m/m)] 2 g / Hamamelis, ethanol. Decoctum Dil. D3 [D3 mit Ethanol 43 % (m/m)] 2 g / Millefolium Dil. D1 2 g.

1 ml entspricht ca. 26 Tropfen.

Darreichungsform und Packungsgröße
50 ml Mischung

Pharmazeutischer Unternehmer und Hersteller
Weleda AG, Postfach 1320, D-73503 Schwäbisch Gmünd
Tel.: 07171 / 919-414, Fax: 07171 / 919-200, E-Mail: dialog@weleda.de

Stand der Information: März 2022