Gebrauchsinformation

Liebe Patientin, lieber Patient!

Bitte lesen Sie diese Gebrauchsinformation aufmerksam, weil sie wichtige Informationen darüber enthält, was Sie bei der Anwendung dieses Arzneimittels beachten sollen. Wenden Sie sich bei Fragen bitte an Ihren Arzt oder Apotheker.

NIGERSAN® D5
Flüssige Verdünnung
Homöopathisches Arzneimittel

Wirkstoff:
Aspergillus niger e volumine mycelii (lyophil., steril.) Dil. D5

Anwendungsgebiete:
Registriertes homöopathisches Arzneimittel, daher ohne Angabe einer therapeutischen Indikation.

Hinweis an den Anwender:
Bei während der Anwendung des Arzneimittels fortdauernden Krankheitssymptomen sollte medizinischer Rat eingeholt werden.

Gegenanzeigen:
*Wann dürfen Sie **NIGERSAN® D5** nicht anwenden?*
Nicht anwenden bei

- bekannter Überempfindlichkeit gegenüber Schimmelpilzen (*Aspergillus niger*)
- Autoimmunerkrankungen
- bei Kindern unter 12 Jahren
- Schwangerschaft und Stillzeit

Vorsichtsmaßnahmen für die Anwendung und Warnhinweise:
Keine bekannt

Wechselwirkungen mit anderen Mitteln:
Andere immunsuppressiv wirkende Arzneimittel können die Wirksamkeit von ***NIGERSAN® D5*** beeinträchtigen.
Vor und nach der Behandlung mit oral verabreichten Lebendimpfstoffen ist ein Abstand von 4 Wochen einzuhalten.

Allgemeiner Hinweis:
Die Wirkung eines homöopathischen Arzneimittels kann durch allgemein schädigende Faktoren in der Lebensweise und durch Reiz- und Genussmittel ungünstig beeinflusst werden. Falls Sie sonstige Arzneimittel einnehmen, fragen Sie Ihren Arzt.

Dosierungsanleitung, Art und Dauer der Anwendung:
Die folgenden Angaben gelten, soweit Ihnen Ihr Arzt nichts anderes verordnet hat. Bitte halten Sie sich an die Anwendungsvorschriften, da dieses Arzneimittel sonst nicht richtig wirken kann!
*Wieviel und wie oft sollten Sie **NIGERSAN® D5** anwenden?*
Soweit nicht anders verordnet:
Zum Einnehmen: 1 – 2 x täglich 5 Tropfen vor einer Mahlzeit
Zum Einreiben: Einmal täglich 5 – 10 Tropfen in die Ellenbeuge einreiben. Bei Besserung der Beschwerden ist die Häufigkeit der Einnahmen zu reduzieren.

1 Milliliter **NIGERSAN® D5** enthält 22 Tropfen.
Hinweis zur korrekten Entnahme aus der Tropfflasche: siehe unten
*Wie lange sollten Sie **NIGERSAN® D5** anwenden?*
Nach längstens 4 Wochen Therapiedauer sollte ***NIGERSAN® D5*** abgesetzt werden.
Auch homöopathische Arzneimittel sollten ohne ärztlichen Rat nicht über längere Zeit angewendet / eingenommen werden.

Nebenwirkungen:
Aufgrund des Gehaltes von ***NIGERSAN® D5*** an spezifischen organischen Bestandteilen können Überempfindlichkeitsreaktionen, hauptsächlich in Form von Hautreaktionen, auftreten und eine Allergie gegen den Bestandteil *Aspergillus niger* ausgelöst werden. Das Arzneimittel ist dann abzusetzen und ein Arzt aufzusuchen.

Hinweis:
Bei der Anwendung eines homöopathischen Arzneimittels können sich die vorhandenen Beschwerden vorübergehend verschlimmern (Erstverschlimmerung). In diesem Fall sollten Sie das Arzneimittel absetzen und Ihren Arzt befragen.
Wenn Sie Nebenwirkungen bemerken, wenden Sie sich an Ihren Arzt oder Apotheker oder das medizinische Fachpersonal. Dies gilt auch für Nebenwirkungen, die nicht in dieser Packungsbeilage angegeben sind. Sie können Nebenwirkungen auch direkt dem Bundesinstitut für Arzneimittel und Medizinprodukte, Abt. Pharmakovigilanz, Kurt-Georg-Kiesinger-Allee 3, D-53175 Bonn, Webseite: www.bfarm.de anzeigen. Indem Sie Nebenwirkungen melden, können Sie dazu beitragen, dass mehr Informationen über die Sicherheit dieses Arzneimittel zur Verfügung gestellt werden.

Hinweise und Angaben zur Haltbarkeit des Arzneimittels:
Das Verfalldatum ist auf dem Flaschenetikett und der äußeren Umhüllung aufgedruckt. Verwenden Sie diese Packung nicht mehr nach diesem Datum! – Das Arzneimittel darf nach Öffnung der Flasche höchstens noch 2 Monate verwendet werden. – Bitte verschließen Sie die Flasche sofort nach Gebrauch. Berühren Sie die Tropfmontur nach Entfernung der Abdeckkappe nicht an der Spitze; unsachgemäße Behandlung verkürzt die Haltbarkeit des Arzneimittels. – Falls die Lösung nicht mehr klar, sondern trübe oder flockig aussieht, soll das Arzneimittel auch vor Ablauf des Verfalldatums nicht mehr verwendet werden.

Zusammensetzung:
10 ml flüssige Verdünnung enthalten:
Wirkstoff:
10 ml Aspergillus niger e volumine mycelii (lyophil., steril.) Dil. D5 (HAB, V. 5a, Lsg. D1 mit gereinigtem Wasser).

Darreichungsform und Inhalt:
10 ml / 10 ml (unverkäufliches Muster) / 10 x 10 ml flüssige Verdünnung zum Einnehmen und Einreiben in die Haut.

Pharmazeutischer Unternehmer und Hersteller:
SANUM-KEHLBECK GmbH & Co. KG
Postfach 1355, D-27316 Hoya
Telefon: +49 (0)4251 93 52-0
Telefax: +49 (0)4251 93 52-291
E-Mail: info@sanum.com

Bitte bewahren Sie das Arzneimittel für Kinder unzugänglich auf!

Reg.-Nr.: 205.00.00

Apothekenpflichtig

Stand der Gebrauchsinformation: 11/2017



Trennring an der abstehenden Lasche anfassen und rundherum abziehen.



Weiße Schutzkappe mit Daumen und Zeigefinger kräftig anfassen und zur Seite abknicken.



Tropfenweise Entnahme durch vorsichtiges Zusammendrücken der Gummi-Pipette mit Daumen und Zeigefinger.



Nach Gebrauch Schutzkappe fest aufdrücken, bis sie hörbar einrastet. Hierdurch dichter Verschluß der Tropfflasche.

Hinweis:

Zur weiteren Anwendung stehen **NIGERSAN®**, Flüssige Verdünnung zur Injektion, Kapseln, Tabletten und Zäpfchen zur Verfügung.