5. Wie ist Biochemie 8 Natrium chloratum D 6 / D 12 aufzubewahren?

Bewahren Sie dieses Arzneimittel für Kinder unzugänglich auf.
Sie dürfen dieses Arzneimittel nach dem auf dem Behältnis und dem Umkarton nach „Verwendbar bis“ angegebenen Verfalldatum nicht mehr verwenden. Das Verfalldatum bezieht sich auf den letzten Tag des angegebenen Monats.
Das Tablettenglas fest verschlossen halten, um den Inhalt vor Feuchtigkeit zu schützen.
Nach Anbruch ist dieses Arzneimittel innerhalb von 12 Monaten aufzubrauchen.

6. Inhalt der Packung und weitere Informationen

Was Biochemie 8 Natrium chloratum D 6 / D 12 enthält

1 Tablette (265 mg) Biochemie 8 Natrium chloratum D 6 enthält den Wirkstoff:
Natrium chloratum Trit. D 6 250 mg.
Die sonstigen Bestandteile sind:
Kartoffelstärke, Magnesiumstearat.
1 Tablette (265 mg) Biochemie 8 Natrium chloratum D 12 enthält den Wirkstoff:
Natrium chloratum Trit. D 12 250 mg.
Die sonstigen Bestandteile sind:
Kartoffelstärke, Magnesiumstearat.

Wie Biochemie 8 Natrium chloratum D 6 / D 12 aussieht und Inhalt der Packung

Biochemie 8 Natrium chloratum D 6 ist in folgenden Packungsgrößen erhältlich:
– 80 Tabletten in einem Tablettenglas
– 200 Tabletten in einem Tablettenglas
– 500 Tabletten in einem Tablettenglas

Biochemie 8 Natrium chloratum D 12 ist in folgenden Packungsgrößen erhältlich:
– 80 Tabletten in einem Tablettenglas
– 200 Tabletten in einem Tablettenglas

Pharmazeutischer Unternehmer und Hersteller

Bombastus-Werke AG
Wilsdruffer Straße 170
01705 Freital
Deutschland
Telefon: +49 351 65803-0
E-Mail: info@bombastus-werke.de

Diese Packungsbeilage wurde zuletzt überarbeitet im Juni 2026.

Reg.-Nr. 66839.00.00
Apothekenpflichtig

Weitere Angaben zum Arzneimittel

Biochemie 8 Natrium chloratum D 6 / Biochemie 8 Natrium chloratum D 12 ist frei von bestimmten Weizeneiweißen (glutenfrei) und kann daher auch von Zöliakie-/Spruekranken angewendet werden.

2026-06/14149002-2-0

Gebrauchsinformation: Information für den Anwender

Biochemie 8 Natrium chloratum D 6
Biochemie 8 Natrium chloratum D 12

[redacted] [redacted]
E1/8

Tabletten zum Einnehmen
Zur Anwendung bei Säuglingen, Kindern und Erwachsenen
Homöopathisches Arzneimittel

Lesen Sie die gesamte Packungsbeilage sorgfältig durch, bevor Sie mit der Einnahme dieses Arzneimittels beginnen, denn sie enthält wichtige Informationen.
Nehmen Sie dieses Arzneimittel immer genau wie in dieser Packungsbeilage beschrieben bzw. genau nach Anweisung Ihres Arztes oder Apothekers ein.
- Heben Sie die Packungsbeilage auf. Vielleicht möchten Sie diese später nochmals lesen.
- Fragen Sie Ihren Apotheker, wenn Sie weitere Informationen oder einen Rat benötigen.
- Wenn Sie Nebenwirkungen bemerken, wenden Sie sich an Ihren Arzt oder Apotheker. Dies gilt auch für Nebenwirkungen, die nicht in dieser Packungsbeilage angegeben sind. Siehe Abschnitt 4.
- Wenn Sie sich nach 7 Tagen nicht besser oder gar schlechter fühlen, wenden Sie sich an Ihren Arzt.

Was in dieser Packungsbeilage steht

1. Was ist Biochemie 8 Natrium chloratum D 6 / D 12 und wofür wird es angewendet?
2. Was sollten Sie vor der Einnahme von Biochemie 8 Natrium chloratum D 6 / D 12 beachten?
3. Wie ist Biochemie 8 Natrium chloratum D 6 / D 12 einzunehmen?
4. Welche Nebenwirkungen sind möglich?
5. Wie ist Biochemie 8 Natrium chloratum D 6 / D 12 aufzubewahren?
6. Inhalt der Packung und weitere Informationen

1. Was ist Biochemie 8 Natrium chloratum D 6 / D 12 und wofür wird es angewendet?

Biochemie 8 Natrium chloratum D 6 / Biochemie 8 Natrium chloratum D 12 ist ein registriertes homöopathisches Arzneimittel und daher ohne Angabe einer therapeutischen Indikation.

2. Was sollten Sie vor der Einnahme von Biochemie 8 Natrium chloratum D 6 / D 12 beachten?

Biochemie 8 Natrium chloratum D 6 / D 12 darf nicht eingenommen werden

– bei Frühgeborenen,
– wenn Sie überempfindlich (allergisch) gegen den Wirkstoff oder einen der sonstigen Bestandteile von Biochemie 8 Natrium chloratum D 6 / Biochemie 8 Natrium chloratum D 12 sind.

Warnhinweise und Vorsichtsmaßnahmen

Besondere Vorsicht bei der Einnahme ist erforderlich, wenn während der Anwendung des Arzneimittels Ihre Beschwerden bestehen bleiben. Bitte holen Sie sich in diesem Fall medizinischen Rat.

Kinder

Bei bestimmungsgemäßem Gebrauch kann Biochemie 8 Natrium chloratum D 6 / Biochemie 8 Natrium chloratum D 12 bei Kindern aller Altersklassen (vom zum Termin geborenen Säugling an) angewendet werden.

Einnahme von Biochemie 8 Natrium chloratum D 6 / D 12 zusammen mit anderen Arzneimitteln

Bitte informieren Sie Ihren Arzt oder Apotheker, wenn Sie andere Arzneimittel anwenden, kürzlich andere Arzneimittel angewendet haben oder beabsichtigen, andere Arzneimittel anzuwenden.
Wechselwirkungen sind bisher nicht bekannt.
Allgemeiner Hinweis: Die Wirkung eines homöopathischen Arzneimittels kann durch allgemein schädigende Faktoren in der Lebensweise und durch Reiz- und Genussmittel ungünstig beeinflusst werden.

Schwangerschaft und Stillzeit

Wenn Sie schwanger sind oder stillen, oder wenn Sie vermuten, schwanger zu sein oder beabsichtigen, schwanger zu werden, fragen Sie vor der Einnahme dieses Arzneimittels Ihren Arzt oder Apotheker um Rat.

Verkehrstüchtigkeit und Fähigkeit zum Bedienen von Maschinen

Es sind keine besonderen Vorsichtsmaßnahmen erforderlich.

Biochemie 8 Natrium chloratum D 6 / D 12 enthält Lactose

Bitte nehmen Sie Biochemie 8 Natrium chloratum D 6 / Biochemie 8 Natrium chloratum D 12 erst nach Rücksprache mit Ihrem Arzt ein, wenn Ihnen bekannt ist, dass Sie unter einer Unverträglichkeit gegenüber bestimmten Zuckern leiden.

1 Tablette enthält 250 mg Lactose (eine Quelle für 125 mg Glucose und 125 mg Galactose). Wenn Sie eine Diabetes-Diät einhalten müssen, sollten Sie dies berücksichtigen.

3. Wie ist Biochemie 8 Natrium chloratum D 6 / D 12 einzunehmen?

Nehmen Sie dieses Arzneimittel immer genau wie in dieser Packungsbeilage beschrieben bzw. genau nach Anweisung Ihres Arztes oder Apothekers ein. Bitte fragen Sie bei Ihrem Arzt oder Apotheker nach, wenn Sie sich nicht sicher sind.

Art und Dauer der Anwendung

Sie sollten die Tablette eine halbe Stunde vor oder nach dem Essen einnehmen und sie vorzugsweise langsam im Mund zergehen lassen. Auch homöopathische Medikamente sollten ohne ärztlichen Rat nicht über längere Zeit (ca. 14 Tage) angewendet werden.

Wenn Sie weitere Fragen zur Anwendung des Arzneimittels haben, fragen Sie Ihren Arzt oder Apotheker.

4. Welche Nebenwirkungen sind möglich?

Wie alle Arzneimittel kann auch dieses Arzneimittel Nebenwirkungen haben, die aber nicht bei jedem auftreten müssen.
Es sind keine Nebenwirkungen bekannt.

Besondere Hinweise

Bei der Anwendung eines homöopathischen Arzneimittels können sich die vorhandenen Beschwerden vorübergehend verschlimmern (Erstverschlimmerung). In diesem Fall sollten Sie das Arzneimittel absetzen und Ihren Arzt befragen.

Meldung von Nebenwirkungen

Wenn Sie Nebenwirkungen bemerken, wenden Sie sich an Ihren Arzt oder Apotheker. Dies gilt auch für Nebenwirkungen, die nicht in dieser Packungsbeilage angegeben sind. Sie können Nebenwirkungen auch direkt dem Bundesinstitut für Arzneimittel und Medizinprodukte, Abt. Pharmakovigilanz, Kurt-Georg-Kiesinger Allee 3, D-53175 Bonn, Website: www.bfarm.de anzeigen.
Indem Sie Nebenwirkungen melden, können Sie dazu beitragen, dass mehr Informationen über die Sicherheit dieses Arzneimittels zur Verfügung gestellt werden.