Adrisin
Tabletten

Wortlaut für die Packungsbeilage

Gebrauchsinformation

Homöopathisches Arzneimittel
Adrisin
Tabletten

Registriertes homöopathisches Arzneimittel, daher ohne Angabe einer therapeutischen Indikation.
Bei während der Anwendung fortdauernden Krankheitssymptomen ist medizinischer Rat einzuholen.

Gegenanzeigen

Nicht anwenden bei bekannter Allergie (Überempfindlichkeit) gegen Arnica oder gegen andere Korbblütler, gegen Bärlappsporen (Lycopodium clavatum), einen der übrigen Wirkstoffe oder der sonstigen Bestandteile.

Vorsichtsmaßnahmen für die Anwendung
Fragen Sie vor der Anwendung von allen Arzneimitteln in der Schwangerschaft und Stillzeit Ihren Arzt um Rat.

Die Anwendung bei Kindern und Jugendlichen unter 18 Jahren soll nur nach Rücksprache mit einem homöopathisch erfahrenen Therapeuten erfolgen.

Wechselwirkungen
Die Wirkung eines homöopathischen Arzneimittels kann durch allgemein schädigende Faktoren in der Lebensweise und durch Reiz- und Genussmittel ungünstig beeinflusst werden.
Bitte informieren Sie Ihren Arzt oder Apotheker, wenn Sie andere Arzneimittel einnehmen bzw. vor kurzem eingenommen haben, auch wenn es sich um nicht verschreibungspflichtige Arzneimittel handelt.

Warnhinweise
Dieses Arzneimittel enthält Lactose.
Bitte nehmen Sie das Arzneimittel daher erst nach Rücksprache mit Ihrem Arzt ein, wenn Ihnen bekannt ist, dass Sie unter einer Unverträglichkeit gegenüber bestimmten Zuckern leiden.

Art der Anwendung
Zum Einnehmen.

Dauer der Behandlung
Auch homöopathische Arzneimittel sollten nicht über längere Zeit ohne ärztlichen Rat angewendet werden.

Nebenwirkungen
Wie alle Arzneimittel kann Adrisin Nebenwirkungen haben, die aber nicht bei jedem auftreten müssen.
Hinweis:
Bei der Anwendung von homöopathischen Arzneimitteln können sich vorhandene Beschwerden vorübergehend verschlimmern (Erstverschlimmerung). In diesem Fall sollten Sie das Arzneimittel absetzen und Ihren Arzt befragen.

Meldung von Nebenwirkungen
Wenn Sie Nebenwirkungen bemerken, wenden Sie sich an Ihren Arzt oder Apotheker. Dies gilt auch für Nebenwirkungen, die nicht in dieser Packungsbeilage angegeben sind. Sie können Nebenwirkungen auch direkt dem Bundesinstitut für Arzneimittel und Medizinprodukte, Abt. Pharmakovigilanz, Kurt-Georg-Kiesinger-Allee 3, D-53175 Bonn, Website: www.bfarm.de anzeigen.
Indem Sie Nebenwirkungen melden, können Sie dazu beitragen, dass mehr Informationen über die Sicherheit dieses Arzneimittels zur Verfügung gestellt werden.

Hinweise zu Verfallsdatum und Aufbewahrung
Arzneimittel unzugänglich für Kinder aufbewahren!

Das Verfallsdatum dieser Packung ist auf Behältnis und äußere Umhüllung aufgedruckt. Verwenden Sie diese Packung nicht mehr nach diesem Datum!

Für dieses Arzneimittel sind keine besonderen Lagerbedingungen erforderlich.

Nach Anbruch 12 Monate haltbar.

Zusammensetzung:
1 Tablette enthält:
Wirkstoffe:

Acidum arsenicosum Trit.	D8	15,0 mg
Acidum formicicum Trit.	D8	15,0 mg
Acidum sulfuricum Trit.	D22	15,0 mg
Arctium Trit.	D8	15,0 mg
Arnica montana Trit.	D6	15,0 mg
Graphites Trit.	D10	15,0 mg
Histaminum dihydrochloricum Trit.	D8	15,0 mg
Histaminum dihydrochloricum Trit.	D12	15,0 mg
Histaminum dihydrochloricum Trit.	D22	15,0 mg
Ledum palustre Trit.	D8	15,0 mg
Lycopodium clavatum Trit.	D6	15,0 mg
Pix liquida (HAB 34) Trit.	D10 [HAB, Vorschrift 5a, Lösung D1 mit Ethanol 86% (m/m)]	15,0 mg
Selenium Trit.	D12	15,0 mg
Stibium sulfuratum nigrum Trit.	D10	15,0 mg
Strychnos ignatii Trit.	D6	15,0 mg
Sulfur Trit.	D12	15,0 mg
Tellurium metallicum Trit.	D10 (HAB, Vorschrift 6)	15,0 mg
Thuja occidentalis Trit.	D6	15,0 mg

Gemeinsame Potenzierung über die letzten 2 Stufen.

Sonstige Bestandteile:
Lactose-Monohydrat
Magnesiumstearat

Packungsgrößen
50, 100 und 250 Tabletten

Pharmazeutischer Unternehmer und Hersteller
Biologische Heilmittel Heel GmbH
Dr.-Reckeweg-Str. 2-4
76532 Baden-Baden
Telefon: 07221-50100
Telefax: 07221-501210
E-Mail: info@heel.de

Weitere Angaben
Apothekenpflichtig.

Reg.-Nr.: 85312.00.00

Stand der Information
Februar 2019