Arzneimittelname: 64 Mercur. solub. F Komplex
Antragsteller: NESTMANN Pharma GmbH

Wortlaut der für das Behältnis vorgesehenen Angaben:
Hinweis: Das Arzneimittel kommt gemäß § 11 Abs. 6 AMG ohne Packungsbeilage in den Verkehr. Die Angaben nach § 11 Abs. 1 bis 4 stehen auf Rollenetiketten auf dem Behältnis.

Außen sichtbar: Angaben nach § 10 AMG

NESTMANN Pharma GmbH
96199 Zapfendorf/Bamberg

64 Mercur. solub. F Komplex
Homöopathisches Arzneimittel

Reg.-Nr.: 2513005.00.00

Ch.-B.:

Tabletten zum Einnehmen

Inhalt: 120 Tabletten

Zusammensetzung:
1 Tablette enthält:
Arzneilich wirksame Bestandteile:

Mercurius solubilis Hahnemanni Trit. D8	22,5 mg
Ignatia Trit. D4	22,5 mg
Kalium bichromicum Trit. D4	22,5 mg
Natrium nitricum Trit. D3	22,5 mg
Selenium Trit. D5	22,5 mg
Spongia Trit. D3	22,5 mg

Sonstige Bestandteile: Lactose-Monohydrat, Magnesiumstearat, Kartoffelstärke.
Enthält Lactose. Packungsbeilage beachten!

Registriertes homöopathisches Arzneimittel, daher ohne Angabe einer therapeutischen Indikation.
Bei während der Anwendung fortdauernden Krankheitssymptomen ist medizinischer Rat einzuholen.

Verwendbar bis

Arzneimittel unzugänglich für Kinder aufbewahren!
Nicht über 25 °C aufbewahren.

Apothekenpflichtig

Bei Mustern zusätzlich der Hinweis: „Unverkäufliches Muster“

Wortlaut der für das Behältnis vorgesehenen Angaben:
Hinweis: Das Arzneimittel kommt gemäß § 11 Abs. 6 AMG ohne Packungsbeilage in den Verkehr. Die Angaben nach § 11 Abs. 1 bis 4 stehen auf Rollenetiketten auf dem Behältnis.

Nach Aufrollen sichtbar: Angaben nach § 11 AMG

Liebe Patientin, lieber Patient!

Bitte lesen Sie die Gebrauchsinformation aufmerksam, weil sie wichtige Informationen darüber enthält, was Sie bei der Anwendung dieses Arzneimittels beachten sollen. Wenden Sie sich bei Fragen bitte an Ihren Arzt oder Apotheker.

Gebrauchsinformation

64 Mercur. solub. F Komplex
Homöopathisches Arzneimittel

Zusammensetzung:
1 Tablette enthält:
Arzneilich wirksame Bestandteile:

Mercurius solubilis Hahnemanni Trit. D8	22,5 mg
Ignatia Trit. D4	22,5 mg
Kalium bichromicum Trit. D4	22,5 mg
Natrium nitricum Trit. D3	22,5 mg
Selenium Trit. D5	22,5 mg
Spongia Trit. D3	22,5 mg

Sonstige Bestandteile: Lactose-Monohydrat, Magnesiumstearat, Kartoffelstärke.

Tabletten, Originalpackung mit 120 Tabletten.

Pharmazeutischer Unternehmer und Hersteller:
NESTMANN Pharma GmbH, Weiherweg 17,
D-96199 Zapfendorf/Bamberg, Tel. 09547/92210 Fax 09547/215

Anwendungsgebiete:
Registriertes homöopathisches Arzneimittel, daher ohne Angabe einer therapeutischen Indikation.
Hinweis: Bei während der Anwendung des Arzneimittels fortdauernden Krankheitssymptomen ist medizinischer Rat einzuholen.

Wortlaut der für das Behältnis vorgesehenen Angaben:
Hinweis: Das Arzneimittel kommt gemäß § 11 Abs. 6 AMG ohne Packungsbeilage in den Verkehr. Die Angaben nach § 11 Abs. 1 bis 4 stehen auf Rollenetiketten auf dem Behältnis.

Nach Aufrollen sichtbar: Angaben nach § 11 AMG

Gegenanzeigen:
Wann dürfen Sie 64 Mercur. solub. F Komplex nicht einnehmen?
64 Mercur. solub. F Komplex soll bei Chromüberempfindlichkeit und bei Jodüberempfindlichkeit nicht angewendet werden.

Wann dürfen Sie 64 Mercur. solub. F Komplex erst nach Rücksprache mit dem Arzt anwenden?
64 Mercur. solub. F Komplex soll bei Schilddrüsenerkrankungen nur nach Rücksprache mit dem Arzt angewendet werden.

Vorsichtsmaßnahmen für die Anwendung und Warnhinweise:
Was müssen Sie in der Schwangerschaft und Stillzeit beachten?
Da keine ausreichend dokumentierten Erfahrungen vorliegen, sollte das Arzneimittel in der Schwangerschaft und Stillzeit nur nach Rücksprache mit dem Arzt angewendet werden.
Besondere Hinweise zur Anwendung im Kindesalter:
Zur Anwendung dieses Arzneimittels bei Kindern liegen keine ausreichend dokumentierten Erfahrungen vor. Es soll deshalb bei Kindern unter 12 Jahren nicht angewendet werden.
Was müssen Sie vor der Anwendung von 64 Mercur. solub. F Komplex beachten?
Besondere Vorsicht bei der Anwendung von 64 Mercur. solub. F Komplex ist erforderlich.
Wichtige Warnhinweise über bestimmte Bestandteile von 64 Mercur. solub. F Komplex.
Diese Arzneimittel enthält Lactose. Bitte nehmen Sie 64 Mercur. solub. F Komplex daher erst nach Rücksprache mit Ihrem Arzt ein, wenn Ihnen bekannt ist, dass Sie unter einer Zuckerunverträglichkeit leiden.

Wechselwirkungen mit anderen Mitteln:
Keine bekannt.
Allgemeiner Hinweis:
Die Wirkung eines homöopathischen Arzneimittels kann durch allgemein schädigende Faktoren in der Lebensweise und durch Reiz- und Genussmittel ungünstig beeinflußt werden.
Falls Sie sonstige Arzneimittel einnehmen, holen Sie medizinischen Rat ein.

Dosierungsanleitung, Art der Anwendung:
Soweit nicht anders verordnet, bei akuten Zuständen alle halbe bis ganze Stunde, höchstens 6mal täglich, je 1 Tablette vor bzw. zwischen den Mahlzeiten einnehmen. Eine über eine Woche hinausgehende Anwendung sollte nur nach Rücksprache mit einem homöopathisch erfahrenen Therapeuten erfolgen.
Bei chronischen Verlaufsformen 1-3mal täglich je 1 Tablette einnehmen.
Bei Besserung der Beschwerden ist die Häufigkeit der Anwendung zu reduzieren.

Wortlaut der für das Behältnis vorgesehenen Angaben:
Hinweis: Das Arzneimittel kommt gemäß § 11 Abs. 6 AMG ohne Packungsbeilage in den Verkehr. Die Angaben nach § 11 Abs. 1 bis 4 stehen auf Rollenetiketten auf dem Behältnis.

Nach Aufrollen sichtbar: Angaben nach § 11 AMG

Dauer der Anwendung:
Auch homöopathische Arzneimittel sollten nicht über längere Zeit ohne medizinischen Rat eingenommen werden.
Ohne ärztlichen Rat nicht länger als eine Woche einnehmen.

Hinweise für den Fall der Überdosierung:
Was ist zu tun, wenn 64 Mercur. solub. F Komplex in zu großen Mengen eingenommen wurde?
Bei der Einnahme größerer Mengen des Arzneimittels kann es bei Personen mit Milchzuckerunverträglichkeit (Lactoseintoleranz) zu Magen-Darm-Beschwerden kommen oder eine abführende Wirkung auftreten.

Nebenwirkungen:
Nach Anwendung können verstärkt Speichelfluß oder in Einzelfällen Hautreaktionen auftreten, das Mittel ist dann abzusetzen.
Wegen des Bestandteils „Mercurius“ (Quecksilber) können gelegentlich allergische Reaktionen auftreten.
Wenn Sie Nebenwirkungen bemerken, wenden Sie sich an Ihren Arzt, Apotheker oder das medizinische Fachpersonal. Dies gilt auch für Nebenwirkungen, die nicht in dieser Packungsbeilage angegeben sind. Sie können Nebenwirkungen auch direkt dem Bundesinstitut für Arzneimittel und Medizinprodukte, Abt. Pharmakovigilanz, Kurt-Georg-Kiesinger Allee 3, D-53175 Bonn, Website: www.bfarm.de anzeigen. Indem Sie Nebenwirkungen melden, können Sie dazu beitragen, dass mehr Informationen über die Sicherheit dieses Arzneimittels zur Verfügung gestellt werden.
Hinweis:
Bei der Einnahme eines homöopathischen Arzneimittels können sich die vorhandenen Beschwerden vorübergehend verschlimmern (Erstverschlimmerung). In diesem Fall sollten Sie das Arzneimittel absetzen und medizinischen Rat einholen.

Hinweise und Angaben zur Haltbarkeit des Arzneimittels:
Nach Ablauf des auf dem Behältnis angegebenen Verfalldatums soll das Präparat nicht mehr angewendet werden.
Das Arzneimittel ist nach Anbruch des Behältnisses 6 Monate haltbar.

Stand der Information:
März 2016