Tabletten
Reg.-Nr.: 2513011.00.00

Wortlaut der für das Behältnis vorgesehenen Angaben:
Hinweis: Das Arzneimittel kommt gemäß § 11 Abs. 6 AMG ohne Packungsbeilage in den Verkehr. Die Angaben nach § 11 Abs. 1 bis 4 stehen auf Rollenetiketten auf dem Behältnis.

Außen sichtbar: Angaben nach § 10 AMG

NESTMANN Pharma GmbH
96199 Zapfendorf/Bamberg

18 Stibium Komplex
Homöopathisches Arzneimittel

Reg.-Nr.: 2513011.00.00

Ch.-B.:

Tabletten zum Einnehmen

Inhalt: 120 Tabletten

Zusammensetzung:
1 Tablette enthält:
Arzneilich wirksame Bestandteile:

Ferrum sulfuricum Trit. D6	27 mg
Antimonium sulfuratum aurantiacum Trit. D4	27 mg
Natrium nitricum Trit. D4	27 mg
Arsenicum album Trit. D6	27 mg
Mercurius solubilis Hahnemanni Trit. D6	27 mg

Sonstige Bestandteile: Lactose-Monohydrat, Magnesiumstearat, Kartoffelstärke.

Registriertes homöopathisches Arzneimittel, daher ohne Angabe einer therapeutischen Indikation.
Bei während der Anwendung fortdauernden Krankheitssymptomen ist medizinischer Rat einzuholen.

Verwendbar bis

Arzneimittel unzugänglich für Kinder aufbewahren!

Nicht über 25 °C aufbewahren.

Apothekenpflichtig

Bei Mustern zusätzlich der Hinweis: „Unverkäufliches Muster“

Wortlaut der für das Behältnis vorgesehenen Angaben:
Hinweis: Das Arzneimittel kommt gemäß § 11 Abs. 6 AMG ohne Packungsbeilage in den Verkehr. Die Angaben nach § 11 Abs. 1 bis 4 stehen auf Rollenetiketten auf dem Behältnis.

Nach Aufrollen sichtbar: Angaben nach § 11 AMG

Liebe Patientin, lieber Patient!

Bitte lesen Sie die Gebrauchsinformation aufmerksam, weil sie wichtige Informationen darüber enthält, was Sie bei der Anwendung dieses Arzneimittels beachten sollen. Wenden Sie sich bei Fragen bitte an Ihren Arzt oder Apotheker.

Gebrauchsinformation

18 Stibium Komplex
Homöopathisches Arzneimittel

Zusammensetzung:
1 Tablette enthält:
Arzneilich wirksame Bestandteile:

Ferrum sulfuricum Trit. D6	27 mg
Antimonium sulfuratum aurantiacum Trit. D4	27 mg
Natrium nitricum Trit. D4	27 mg
Arsenicum album Trit. D6	27 mg
Mercurius solubilis Hahnemanni Trit. D6	27 mg

Sonstige Bestandteile: Lactose-Monohydrat, Magnesiumstearat, Kartoffelstärke.

Tabletten, Originalpackung mit 120 Tabletten.

NESTMANN Pharma GmbH
Weiherweg 17
D-96199 Zapfendorf/Bamberg
Tel. 09547/92210 Fax 09547/215

Anwendungsgebiete:
Registriertes homöopathisches Arzneimittel, daher ohne Angabe einer therapeutischen Indikation.
Hinweis: Bei während der Anwendung des Arzneimittels fortdauernden Krankheitssymptomen ist medizinischer Rat einzuholen.

Gegenanzeigen:
Wann dürfen Sie 18 Stibium Komplex nicht einnehmen?
18 Stibium Komplex darf nicht eingenommen werden bei Nierenfunktionsstörungen, bei Säuglingen und Kleinkindern sowie in Schwangerschaft und Stillzeit.

Wortlaut der für das Behältnis vorgesehenen Angaben:
Hinweis: Das Arzneimittel kommt gemäß § 11 Abs. 6 AMG ohne Packungsbeilage in den Verkehr. Die Angaben nach § 11 Abs. 1 bis 4 stehen auf Rollenetiketten auf dem Behältnis.

Nach Aufrollen sichtbar: Angaben nach § 11 AMG

Vorsichtsmaßnahmen für die Anwendung und Warnhinweise:
Zur Anwendung dieses Arzneimittels bei Kindern zwischen dem 6. und 12. Lebensjahr liegen keine ausreichend dokumentierten Erfahrungen vor. Es soll deshalb bei Kindern zwischen 6 und 12 Jahren nicht angewendet werden.

Wechselwirkungen mit anderen Mitteln:
Keine bekannt.
Allgemeiner Hinweis:
Die Wirkung eines homöopathischen Arzneimittels kann durch allgemein schädigende Faktoren in der Lebensweise und durch Reiz- und Genussmittel ungünstig beeinflußt werden. Falls Sie sonstige Arzneimittel einnehmen, fragen Sie Ihren Arzt.

Dosierungsanleitung, Art der Anwendung:
Soweit nicht anders verordnet 1 – 3 mal täglich 1 Tablette vor oder zwischen den Mahlzeiten einnehmen.
Bei Besserung der Beschwerden ist die Häufigkeit der Anwendung zu reduzieren.

Dauer der Anwendung:
Ohne medizinischen Rat nicht länger als 1 Woche anwenden.

Hinweise für den Fall der Überdosierung:
Was ist zu tun, wenn 18 Stibium Komplex in zu großen Mengen eingenommen wurde?
Bei der Einnahme größerer Mengen des Arzneimittels kann es bei Personen mit Milchzuckerunverträglichkeit (Lactoseintoleranz) zu Magen-Darm-Beschwerden kommen oder eine abführende Wirkung auftreten.

Nebenwirkungen:
Nach Einnahme kann Speichelfluss auftreten, das Mittel ist dann abzusetzen.
Wenn Sie Nebenwirkungen bemerken, wenden Sie sich an Ihren Arzt, Apotheker oder das medizinische Fachpersonal. Dies gilt auch für Nebenwirkungen, die nicht in dieser Packungsbeilage angegeben sind. Sie können Nebenwirkungen auch direkt dem Bundesinstitut für Arzneimittel und Medizinprodukte, Abt. Pharmakovigilanz, Kurt-Georg-Kiesinger Allee 3, D-53175 Bonn, Website: www.bfarm.de anzeigen. Indem Sie Nebenwirkungen melden, können Sie dazu beitragen, dass mehr Informationen über die Sicherheit dieses Arzneimittels zur Verfügung gestellt werden.

Wortlaut der für das Behältnis vorgesehenen Angaben:
Hinweis: Das Arzneimittel kommt gemäß § 11 Abs. 6 AMG ohne Packungsbeilage in den Verkehr. Die Angaben nach § 11 Abs. 1 bis 4 stehen auf Rollenetiketten auf dem Behältnis.

Nach Aufrollen sichtbar: Angaben nach § 11 AMG

Hinweis:
Bei der Einnahme eines homöopathischen Arzneimittels können sich die vorhandenen Beschwerden vorübergehend verschlimmern (Erstverschlimmerung). In diesem Fall sollte medizinischer Rat eingeholt werden.

Hinweise und Angaben zur Haltbarkeit des Arzneimittels:
Nach Ablauf des auf dem Behältnis angegebenen Verfalldatums soll das Präparat nicht mehr angewendet werden.
Das Arzneimittel ist nach Anbruch des Behältnisses 6 Monate haltbar.

Stand der Information:
März 2016